

Les soins dentaires sous anesthésie de votre enfant ou de votre proche à besoins particuliers

Mon enfant va être endormi pour recevoir un traitement dentaire en salle d'opération.

ATTENTION !

Le dentiste ne peut pas prévoir à l'avance le nombre de dents qui sera soignées ou enlevées.

AVANT L'INTERVENTION

- Je signe un consentement pour la réalisation des soins ou des extractions dentaires à faire par le dentiste
- Mon enfant ne mange pas et ne boit pas pendant 6h avant l'intervention

EN SALLE D'OPERATION

- Le dentiste va soigner et/ou enlever les dents abîmées. Il n'a pas pu prévoir le nombre exact en consultation.

APRES LE TRAITEMENT ET PENDANT 24H APRÈS,

MON ENFANT RISQUE DE RESSENTIR CERTAINS EFFETS SECONDAIRES SOUVENT LÉGERS ET TRANSITOIRES

- De légers saignements
- Des douleurs à traiter avec du paracétamol
- Un léger gonflement du visage pouvant être diminué par la mise en place de poches de glace (pas plus de 20 minutes d'affilés)
- Un hématome
- Des nausées liées à l'anesthésie



Toutefois, si je remarque à la maison des effets secondaires importants ou persistants, je n'hésite pas à contacter le service de dentisterie au 071 37 92 87 entre 8h30 et 16h30 du lundi au vendredi.

En d'autres temps, je contacte mon médecin généraliste ou le service des urgences de la Clinique.



Les dents seront ainsi soignées mais elles peuvent continuer à s'abîmer. Il est donc important de :

- Venir au rendez-vous donné par le dentiste 3 semaines après l'intervention
- Manger le moins de sucre possible
- Boire de l'eau - Eviter des boissons sucrées
- Se brosser les dents au minimum 2 fois par jour après le repas (avec une aide des parents jusqu'à 10 ans ou plus si la personne a des besoins spécifiques)
- Aller consulter le dentiste 2 fois par an